Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd.

AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies N°231
Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 77 635 03 04
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : universtrading@yahoo.fr

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DICHLOFORT 100 EC

Composition : Dichlorvos 1000 g/l

Formulation : Concentré émulsionnable

Cultures : Fruitières et Maraîchères

Hygiène Publique : Locaux d'habitation, Locaux agro-industries, Magasins de stockage alimentaire, Bureaux, etc.

Contrôles : Large gamme d'Insectes, Cafards, Rongeurs

MODE D'EMPLOI

Dichlofort 100 EC agit par contact, inhalation, et ingestion sur de nombreux insectes nuisibles

Il agit rapidement avec un effet de choc tuant l'ensemble des moustiques dans un délai très court.

Il a également une bonne efficacité sur un large éventail d'insectes nuisibles allant de cafards, moustiques, mouches, fourmis, puces, mites, punaises, acariens, ainsi que les rongeurs qui affecte la santé publique.

Le Dichlorvos est un insecticide organophosphoré qui agit sur l'acétylcholinestérase, associée aux systèmes nerveux des insectes d'où son efficacité.

DOSES DE TRAITEMENT

10 à 12,5 ml pour 1 litre d'eau
125 ml pour 10 litres d'eau

DELAI AVANT RECOLTE

3 jours en agriculture

Stockage et élimination :

Conserver dans le récipient d'origine fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil. Récipient à triple rinçage pour l'élimination. Jeter le rinçage en l'ajoutant au réservoir de pulvérisation. Ne brûlez pas de récipients ou de produits vides.

AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies N°231
Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 77 635 03 04
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : universtrading@yahoo.fr

PRECAUTION D'EMPLOI

Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison et les périodes de production d'exsudats. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présents.

Avant de débuter le remplissage de la cuve du pulvérisateur pour préparer la bouillie, s'assurer que celle-ci ne contient aucun résidu liquide ou solide d'un traitement précédent.

D'une manière générale, l'utilisation répétée, sur une même parcelle, de préparations à base de substances actives de la même famille chimique ou ayant le même mode d'action, peut conduire à l'apparition d'organismes résistants. Pour réduire ce risque, l'utilisateur doit raisonner en premier lieu les pratiques agronomiques et respecter les conditions d'emploi du produit.

PREMIERS SOINS

Si dans les yeux:

• Garder les yeux ouverts et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15-20 minutes.
• Retirer les lentilles de contact, si présent, après les 5 premières minutes, puis continuer rincer l'œil.

En cas d'ingestion:

• Appeler un centre antipoison ou un médecin pour des conseils de traitement.
• Faire boire un verre d'eau si capable d'avaler.
• Ne pas faire vomir sauf si indiqué le faire par le centre antipoison ou docteur.
• Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.

Contact avec la peau ou vêtement:

• Enlever les vêtements contaminés.
• Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils de traitement.
- Garder hors de portée des enfants

GARANTIE

Le fabricant garantie la bonne qualité du produit.
Produit distribué par AGROPHARMA, Ngor Virage, Dakar - SENEGAL
Tel : +221 77 635 03 04

COMPATIBILITE

Incompatible avec les matériaux alcalins, le chinométhionate et le dichlofluanide.





