AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies N°231
Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 33 833 08 08
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : sodea@orange.sn

NOTICE TECHNIQUE D'EMPLOI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Nom	**FOSETAL 80% WG**
Type de formulation	WG – Granulés dispersibles
Nom et teneur des matières actives	**Fosetyl aluminium 800 g/kg**
Usage	Fongicide

Utilisable sur plusieurs cultures, **FOSETAL 80% WG** a une action préventive et curative sur de nombreux champignons phycomycètes, en bloquant la germination des spores. C'est un stimulateur des défenses naturelles de la plante traitée. Il est doté d'une excellente systémie ascendante et descendante : absorbé par les feuilles et les racines, il permet une protection complète pendant tout le cycle de développement de la plante, ce qui le rend actif contre de nombreux champignons responsables des maladies telles que le phytophtora, le mildiou etc.

PREPARATION DE LA BOUILLIE

- Remplir au 3/4 d'eau la cuve du pulvérisateur.

- Mettre en route l'agitation et verser dans la cuve la dose de FOSETAL 80% WG nécessaire.

- Terminer le remplissage de la cuve et maintenir l'agitation jusqu'à la fin de l'application.

AGROPHARM SUARL Ngor Virage, Route des Almadies N°231
Dakar – Sénégal
Téléphone : +221 33 833 08 08
Téléfax : +221 33 825 74 92
Adresse e-mail : sodea@orange.sn

TABLEAU DES USAGES ET DOSES RECOMMANDEES

CULTURES	CIBLES/USAGE	DOSE	NOMBRE DE TRAITEMENTS/AN	DELAI AVANT RECOLTE
MELON	Mildiou	4 kg /ha	2 traitements /an parties aériennes	3 jours
ANANAS	Pythiacées, Chancre du Collet(*Phytophtora*)	7,5 Kg/ha	1traitement /an plants	Application effectuée sur le plant avant repiquage
AUTRES AGRUMES	Chancre du Collet*(Phytophtora*)	2,5 Kg/ha	3 traitements /an	15 jours

PREMIERS SOINS

Conseils généraux
S'éloigner de la zone dangereuse. Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart. Si des symptômes apparaissent et persistent, consulter un médecin.

Inhalation :
Amener la victime à l'air libre.

Contact avec la peau :
Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

Contact avec les yeux :
Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Traitement chez un ophtalmologiste.

Ingestion :
Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Garder la victime au repos et la maintenir au chaud.

EMBALLAGES

Sachets de 1 kg.
Carton de 10 sachets.